



PROGRAMA DE VACUNACIÓN CRÍA-LEVANTE EN PONEDORAS LIVIANAS.

DEBEN VENIR VACUNADAS AL 1ER DÍA CON: COCCIVAC D, MARECK,

SALMNOLLEA, NEW CASTLE (INCUBADORA)



Edad	Productos o Biológicos	Vía Administración	Costo/Dosis
7 a 10 días	Univas Plus(G Gumboro v.v)+ N.C Clon30+Ma5 v.v-	Ocular o Spray	0.038+0.029=0.067
3ª Sem	Univas Plus(G Gumboro V.V)+ N.C Clon30+Ma5 v.v	Ocular o Spray	0.038+0.029=0.067
4ª Sem	Micoplasma (Fvax MG)	Ocular o Spray	0.235
5ª Sem	Pneumovirus(TRT v.v)	Ocular o Spray	0.173
6ª Sem	Salmonella Gallinarum viva(Sg9R)	Oral o I.M muslo	0.577
	Cor4+Nd+BI+EDS	S.C-cuello o Intraclavicular	0.725
7ª Sem	Colera viva (M-Ninevax)	Punción Alar	0.142
	Viruela aviar (Avapox)	Punción Alar	0.054
8ª Sem	Corte de Pico		
	Refuerzos		
11 Sem	Salmonella gallinarum viva (Sg9R)	I.M muslo	0.577
	Colera viva (M-Ninvevax)	Punción Alar	0.142
12 Sem	Pneumovirus (TRT Inactivada)	I.M Pechuga o S:C	0.645
13 Sem	Cor4+ND+BI+EDS	I.M Pechuga o S:C	0.725
14 Sem	Salenvac T (Bacterina Inactivada)	I.M Pechuga	0.67
	Viruela (Avapox)	Punción Alar	0.054
15 Sem	Desparasitación		
	Baño Piojicida		
TotalVacuna/av :			4.719