

Micosis

La micosis del tracto digestivo es una enfermedad crónica de las aves, de rara presentación. Sin embargo, ha causado severas pérdidas en aves jóvenes.

Causada por un hongo parecido a la levadura, la micosis afecta principalmente el buche. Es una condición debilitante que indirectamente puede causar otras enfermedades o hacerlas más severas.

Difusión: El hongo candida albicans, eliminado con las materias fecales de las aves afectadas, contamina el agua y alimento.

Síntomas: Los síntomas no son específicas. Los pollitos afectados tienen un crecimiento deficiente, mal aspecto, apatía y plumaje desordenado.

Lesiones: La mucosa del buche se torna engrosada, blanca y áspera. Las úlceras blandas, elevadas, blanco-amarillentas, forman una falsa membrana que se desprende o puede ser quitada fácilmente. El buche está vacío o puede contener una pequeña cantidad de material pegajosa. Ocasionalmente pueden resultar afectados la boca, el esófago y el preventrículo.

Para confirmar el diagnóstico debe hacerse una prueba de laboratorio.

Prevención y Control: La presentación de micosis del tracto digestivo, está generalmente relacionada con falta de higiene. Siguiendo un buen programa de higiene y suministrando alimentos y agua limpia, una cama seca o ambiente exterior adecuado, puede prevenir en gran parte la aparición de micosis.