

Enteritis (No específica)




Como su nombre lo indica, no hay un agente causal definido para este tipo de desorden intestinal. Puede presentarse enteritis no específica en pollos, gallina y pavos. Ocasionalmente causa gran mortalidad, lo que aparentemente es consecuencia de una invasión secundaria de microorganismos.

La enteritis no específica puede ser resultado de calor excesivo, enfriamiento, hacinamiento defectuosa. Los cambios bruscos de alimentación u otros defectos de manejo parecen estar estrechamente relacionado con la ocurrencia de esta afección.

Síntomas: Los síntomas característicos pueden consistir en falta de apetito, modorra y diarrea. La mortalidad generalmente no es alta, pero si afección no se controla puede llevar a serias complicaciones. Las lesiones consisten en inflamación de los intestinos y, a menudo, congestión del hígado.

Cuando la enteritis inespecífica persiste durante largo tiempo, la mucosa intestinal frecuentemente se vuelve áspera, ulcerosa y cubierta por tejidos muertos. Las aves entonces se debilitan y adelgazan. Pueden morir por causa del serio impedimento a la acción digestiva y absorbente del intestino.



Prevención y Control: Eliminando los errores de manejo mencionados arriba y practicando una correcta higiene, serán factores de ayuda para prevenir la enteritis no específica. Para controlarla, administre Strepccillin F-25 en el alimento hasta que las aves se recuperen (2 a 4 días). Refuerce la higiene. Limpie y desinfecte los comederos y bebederos regularmente, usando Germex o Par-O-San.